



मुड खेती सम्बन्धी जानकारी



मुड छोटो समयमै (७०-८० दिनमा) पाक्ने बाली भएकोले, हिउँदे बाली (तोरी, आलु, गहुँ, मुसुरो) काटिसकेपछि खाली रहने जमिनमा यसको खेती गरी मनग्य फाइदा लिन सकिन्छ ।

मुड खेतीबाट हुने मुख्य फाइदाहरू

- **आम्दानीको श्रोत** : एक विघा मुड खेतीबाट रु. ८० हजारसम्म आम्दानी लिन सकिन्छ ।
- **माटोको सुधार** : मुडको भ्यांगलाई माटोमा मिलाउँदा माटोको उर्वराशक्ति बढ्नगई मुड पछि लगाउने बालीमा यूरिया मलको मात्रा घटाउन सकिन्छ ।
- **पौष्टिक आहार** : मुडमा प्रसस्त प्रोटीन हुनुका साथै यो सजिलै पच्ने हुँदा यसको दाल केटाकटी र बिरामीको लागि समेत उत्तम मानिन्छ । यसको दानाबाट विभिन्न परिकार जस्तै : दालमोठ, दाल, भुजिया, टुसा आदि बनाउन सकिन्छ ।

उन्नत मुड खेतीका लागि जान्नुपर्ने कुराहरू

१. जमिनको छनोट

- पानी नजम्ने र उचित निकासको व्यवस्था भएको दोमट माटो मुड खेतीको लागि उपयुक्त हुन्छ । माटोको पी.एच. ६.२-७.२ हुनु पर्छ ।

२. उचित जातहरू

- सिफारिस भएका जातहरू : कल्याण र प्रतिक्षा ।
- सिफारिसका क्रममा रहेका जातहरू : हम-१६, बारि मुड, एस एम एल-६६८, पन्त मुड-५ ।

३. बीउको मात्रा, लगाउने समय र तरिका

- बीउको मात्रा : ५०० देखि ७०० ग्राम प्रति कट्टा
- लगाउने समय : फागुनको दोस्रो हप्तादेखि चैत्रको अन्तिम हप्तासम्म



लाइनमा बीउ छर्ने सीड ड्रिल मेसिन



लाइनमा उम्रेको मुड

- **लगाउने तरिका :** राम्रोसँग खनजोत गरी तयार पारिएको जग्गामा एकनाशले हातले छर्ने वा ट्याक्टरबाट चल्ने बीउ छर्ने सीड ड्रिल मेसिन प्रयोग गर्ने (माथिको चित्रमा जस्तै) ।

नोट :

- » पहिलो पटक मुड लगाउँदा मुडको लागि प्रयोग गरिने राईजोबियम जीवाणु मलले उपचार गरेर बीउ लगाउनुपर्छ । जसले गर्दा जरामा माटोको उर्बरा शक्ति बढाउने गिर्खाहरूको वृद्धि हुन्छ ।
- » मुडको बीउ लाइनमा लगाउँदा बीउको मात्रा कम लाग्नुका साथै भारपात हटाउन रोग किरा नियन्त्रण गर्न र बाली टिप्न सजिलो हुन्छ ।
- » मुडको बीउ ३-५ से.मी.को गहिराईमा रोप्नुपर्छ ।
- » यदि माटो सुक्खा छ भने सिंचाई गरेर मात्र बीउ रोप्नुपर्छ ।

४. मलखाद व्यवस्थापन

- बीउ रोप्नु अगाडि प्रति कट्टा २०० - ३०० किलो कम्पोष्ट मल, २ किलो डि.ए.पि. र १ किलो पोटास छरेर माटोमा राम्रोसँग मिलाउनुपर्छ ।

नोट :

- » फूल फुल्नुअघि नाईट्रोजन तत्वको कमि भई बोट पहुँलो भएमा २० ग्राम यूरिया मल प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्न सकिन्छ ।

५. सिंचाई

- मुड छर्ने बेला माटोमा पर्याप्त चिस्यान हुनु जरुरी छ । माटोको अवस्था अनुसार मुड खेतीको लागि बाली उम्रेको १५-२० दिन पछि पहिलो सिंचाई र फूल फुल्ने बेला दोस्रो सिंचाई दिनुपर्छ ।

नोट :

- » कोसा लागि सकेपछि सिंचाई बन्द गर्नुपर्छ । यसो गर्दा छिटो/एकनासले बाली पाक्न मद्दत पुग्छ ।

६. किरा तथा रोग नियन्त्रण

- लाहि, पतेरो र सेतो भिंगा मुडमा लाग्ने प्रमुख किराहरू हुन् र यी किराको प्रकोप बढी भएमा बोटमा कोसा वा दाना लाग्दैन । यी किराहरू देखापरेमा साइपरमेथ्रिन ५% (१.५ एमएल प्रति लिटर पानीमा) वा च्यापिड (०.५ ग्राम प्रति लिटर पानीमा) मिसाई १-२ पटक छर्नु पर्छ ।
- पात पहुँलिएर छिर्केमिके हुने, थोप्ले रोग, पात डढुवा आदि मुडमा लाग्ने प्रमुख रोगहरू हुन् ।
- छिर्केमिके रोग लागेका बोटलाई तुरुन्त उखेलेर जलाउनु वा गाड्नुपर्छ ।
- थोप्ले रोग, पात डढुवा रोग देखा पर्नासाथ ब्लाइटेक्स-५० नामक बिषादी २.५ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्नुपर्दछ ।

नोट :

- » छिर्केमिके रोग सेतो भिंगाले सार्ने हुँदा यो किरा नलाग्दैन (फूल फुल्ने बेलामा) माथि उल्लेखित बिषादी छर्नुपर्छ ।
- » बिषादी छर्दा सुरक्षात्मक पहिरन जस्तै - मास्क, एप्रोन, पन्जा आदि अनिवार्य लगाउनुपर्छ ।

७. बाली टिप्ने

- माथि उल्लेखित जातहरू बीउ छरेको ६० - ६५ दिनमा प्रथम पटक र ७० - ८० दिनमा दोस्रो पटक कोशा टिप्न सकिन्छ । एक एक गरी कोशा टिप्दा धेरै समय लाग्ने हुँदा, कोशाहरू खैरो रंगमा परिणत भएपछि पाकेका भुप्पा टिप्नुपर्छ । कोशा टिपिसकेपछि ३ - ५ दिन घाममा सुकाउनुपर्छ । उन्नत तरिकाले खेती गर्दा प्रति कट्टा ३० - ४० किलो सम्म मुडको दाना उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
- भण्डारण गर्ने दाना राम्रोसँग सुकेको (टोक्दा किन्त्रिक आवाज आउने) हुनुपर्दछ ।



यो सामग्री अमेरिकी सहयोग नियोग (USAID) द्वारा संचालित सिमिट (CIMMYT) को सिशा (CSISA) परियोजना तथा राष्ट्रिय कोशेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम (NARC) ले संयुक्त रुपमा तयार गरेको हो । विस्तृत जानकारीको लागि : www.csisa.org